

## RECOMENDACIONES DE USO:

### GENERALIDADES:

**GLORY** es una mezcla de fungicidas de acción por contacto, sistémica, preventiva y antiesporulante recomendado para el cultivo de soja, maní y trigo. El mancozeb, actúa en diferentes puntos, induciendo una inhibición enzimática múltiple, lo que disminuye el riesgo de desarrollo de resistencia. La azoxistrobina actúa inhibiendo el sistema respiratorio de los hongos, resultando especialmente eficaz para impedir la germinación de esporas y el desarrollo inicial del patógeno y además, le aporta mayor residualidad al producto. **GLORY** está especialmente recomendado para su uso en rotación con otros fungicidas, a fin de minimizar el riesgo de apariciones de biotipos naturalmente resistentes.

### INSTRUCCIONES PARA EL USO:

**Preparación:** Preparar la cantidad requerida de **GLORY** y adicionar al tanque de la pulverizadora a medio llenar y luego completar a volumen total. Verificar que el sistema de agitación funcione desde el vertido del producto al tanque hasta el final de la aplicación. Utilizar el producto el mismo día de su preparación.

**Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:** **GLORY** puede aplicarse con máquinas terrestres de alto volumen, entre 100 – 200 litros/ha, provistas de pastillas abanico plano y una presión de 40-50 lb/pg<sup>2</sup>. Velocidad de equipo: no mayor a 8 Km/h. Suspender los tratamientos con vientos superiores a 10 km/hora. Debe lograrse una cobertura de 50-70 gotas/cm<sup>2</sup>.

### Recomendaciones de uso:

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de aplicación
Soja	Mancha marrón ( <i>Septoria glycines</i> )*	1,25-1,5 Kg/ha + 0,5 L/ha de MSO	7	Aplicar a partir de R3 (comienzo de fructificación), hasta R6 (máximo tamaño de semilla), o al superarse el umbral de daño establecido para cada enfermedad siempre que las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de las mismas. Usar las dosis mayores en casos donde se presente alta presión de la enfermedad.
	Tizón de la hoja ( <i>Cercospora kikuchii</i> )*			
Maní	Viruela tardía del maní ( <i>Cercosporidium personatum</i> )		15	Realizar la aplicación con la aparición de los primeros síntomas, presentándose más de 2% de incidencia, y condiciones ambientales predisponentes a la enfermedad. Repetir en caso de ser necesario cada 20-25 días.

<b>Trigo</b>	Roya anaranjada ( <i>Puccinia recondita</i> )	1,5 Kg/ha + 0,5 L/ha de MSO	30	Aplicar cuando se observen los primeros síntomas siempre que las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de las enfermedades. Utilizar la dosis mayor en cultivares más susceptibles.
	Roya negra ( <i>Puccinia graminis</i> )			
	Mancha amarilla ( <i>Drechslera tritici</i> )			

(\*) El control de enfermedades de fin de ciclo en soja puede resultar moderado cuando las condiciones de daño al momento de la aplicación son severas.